

# Blumenkohl

1. **Familie** Kreuzblütler

2. **Typen**

- weisse / grüne / violette (mit Übergängen zu Broccoli)
- Frühlings-/Herbsttypen
- Sommertypen

3. **Ansprüche**

- an Boden:** - mittel bis schwer, ausgeglichen feucht, biologisch aktiv
- an Nährstoffe:** - Starkzehrer (frische organische Düngung vermeiden)
- an Klima:** - Frühsorten nach der Anzucht frosthart bis -4°C  
 - auch Sommertypen lieben es nicht zu warm  
 - allg. hoher Wasserbedarf

*Knick' meine Innenblätter ein, dann bleibt die Blume weiß und rein.*



4. **Termine**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Saat f. Setzlinge		-----1-----											
Direktsaat													
Pflanzung				-----									
Ernte						-----							

- Dauer der Anzucht: 6 - 8 Wochen
- Pflanzung bis Erntebeginn: 10 - 12 Wochen (nur kräftige Setzlinge verwenden)
- Dauer der Ernte an 1 Kultur: ca. 2 Wochen
- Anzahl Setzlinge aus 1 g Samen: 150 Stück
- Saatmenge/m<sup>2</sup> bei Direktsaat: 1g
- Keimzeit: 4 - 6 Tage
- Samen keimfähig: 4 Jahre

1 evtl. Direktsaat im Sommer

5. **Kulturtipps, Pflege**

Abstände (in cm): 40 - 60 zw. den Reihen × 50 - 60 in der Reihe (unter Glas/Plastik mehr Standraum nötig als im Freien)

- tief pikieren und pflanzen
- frühe Kulturen sind schädlingsfrei
- Anzucht späterer Sätze mit Netz vor Schädlingen schützen
- Blumenkohl ist ein "heikler Geselle": nur gleichmässiges Wachstum gibt schöne Köpfe
- hoher Düngeranspruch (Stickstoff); frische organische Düngung gibt dem Blumenkohl aber einen unangenehmen Geschmack

## 6. Schädlinge

Arten:	alle Kohlschädlinge (v.a. im Sommer und Herbst, sh. bei Kopfkohl)	Schnecken (insbesondere kleine Nacktschnecken unter Netz)	
Massnahmen - vorbeugend:	junge Pflanzen müssen schädlingsfrei sein (Netz), bei hohem Schädlingsdruck Netz bis zur Ernte belassen; gegen Blattläuse Nützlinge fördern.	vor Anbringen des Netzes Schnecken ködern und sammeln	
- direkt:	Bakterienpräparat Delfin gegen Raupen, Neem gegen Weisse Fliege, Blattläuse	Schneckenkörner	

## 7. Krankheiten

Arten:	Keimlings- und Wurzelkrankheiten	Kohlhernie (sh. bei Kopfkohl)	
Massnahmen - vorbeugend:	besserer Fruchtwechsel v.a. bez. Anzuchterde; helle, nicht zu feuchtwarme Anzucht, früh pikieren		
- direkt:	befallene Setzlinge aussortieren		

## 8. Sorten

- FREMONT F1 (Frühling - Herbst, mässiger Düngeranspruch, Hitze tolerant, gleichmässig)
- IDOL (Frühling-Herbst, mässiger Düngeranspruch, gestaffelte Ernte)
- Bunte Blumenkohl-Broccoli-Kreuzungen (MINARET u.ä.) liefern im Hausgarten keinen sicheren Ertrag.

---

## 9. Diverses

- Mischkulturen mit Sellerie bei Sommerkulturen günstig, wenn kein Netz angebracht wird
- Decken der Mitte mit geknickten Blättern ergibt weissere "Blumen", v.a. bei älteren Sorten
- für Hochsommer-Ernte besser auf Broccoli umstellen

**Herkunft:** Mittelmeerraum und Kleinasien; zuerst in Italien kultiviert