

Cicorino rosso (Radicchio)

1. **Familie** Korbchenblütler

2. **Typen**

- flachrunder, hochrunder oder spitzer Kopf
- rotweisse oder grünrotweisse Innenblätter
- im Herbst einen festen Kopf bildend
- erst nach der Überwinterung (als Wurzel im Boden) einen (lockeren) Kopf bildend (Typ Verona)



3. **Ansprüche**

- an Boden:**
- humusreich, biologisch genügend aktiv
 - Verona: keine Staunässe im Winter
- an Nährstoffe:**
- Mittelzehrer, als Zweitkultur etwas reifen Kompost
- an Klima:**
- Saat der meisten Sorten nicht vor dem längsten Tag
 - Sorten für Herbsterte ertragen wenige Grade Frost
 - Verona: recht kalte Winter werden ertragen

4. **Termine**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Saat f. Setzlinge				-----1-----		---2---						
Direktsaat						---2---						
Pflanzung					-----1-----		---2---					
Ernte				--4--				-----1-----		-----3-----		

- Dauer der Anzucht: 4 - 5 Wochen
- Dauer v. Direktsaat bis Erntebeginn: 13 Wochen (Sommer- bis Herbsterte)
- Pflanzung bis Erntebeginn: 10 Wochen (Herbsternte)
- Dauer der Ernte an 1 Kultur: 4 Wochen (im Herbst bis 8 Wochen)
- Anzahl Setzlinge aus 1 g Samen: 350 St.
- Saatmenge/m² bei Direktsaat: 0.5 g (erdünnern)
- Keimzeit: 8 - 10 Tage
- Samen keimfähig: 4 Jahre

- 1 nur spezielle Sommersorten
- 2 alle Sorten
- 3 Herbstsorten
- 4 Wintersorten (Verona) im Folgejahr

5. **Kulturtipps, Pflege**

Abstände (in cm): 30 zw. den Reihen × 25 in der Reihe

- Herbsterte-Sorten stehen im Vordergrund, Kultur ähnlich wie späte Endivien
- neu gibt es auch Sorten für Sommererte, die Nachfrage ist aber im Sommer eher gering
- beim Erdünnern und Pikieren grüne Pflanzen bevorzugen; die schon zu Beginn rotblättrigen Pflanzen machen nur kleine Köpfe
- allgemein recht unterschiedliche Pflanzen innerhalb einer Sorte (Ausnahme F1-Sorten)
- Schosser bei falschem Saattermin oder Wassermangel möglich
- beim Ernten alle äusseren grünen Blätter entfernen, sie sind zu bitter für unseren Gaumen

6. Schädlinge

Arten:	Wurzelläuse (weisser Filz an den Wurzeln, Fäulnis)	Erdräupen u.a. Bodenschädlinge (plötzliches Welken, Wurzelhals durchgefressen)	
Massnahmen - vorbeugend:	nach Saat ca. 5 Wochen Netz (nicht länger!)	zweistufig erdünnern, überwachen, Ersatzsetzlinge bereit halten	
- direkt:		Raupen etc. ausgraben, zerdrücken	

7. Krankheiten

Arten:	Fäulnis durch diverse Erreger		
Massnahmen - vorbeugend:	widerstandsfähige Sorten, lockerer Bestand, nicht zu feucht halten, Wurzelläuse mit Netz ausperren, bei Frost mit Tüchern decken		
- direkt:			

8. Sorten

- für Frühjahrsernte ("Rosettenzichorie"): VERONA
- für Sommer- bis Herbsternste: INDIGO (warme Anzucht!)
- für Herbsternste: PALLA ROSSA, SELMA ROSSA (rund, rot), ROTE VON TREVISO (spitz, Blätter an Chicorée erinnernd), CASTELFRANCO (hochrund, grünrot-weiss gefleckt, gross)

9. Diverses

- Verona-Sorten (für Frühjahrsernte) im Herbst evtl. ca. 3 cm über dem Boden schneiden, um Faulen zu verhindern (Blätter kompostieren).
- sind die Blätter allzu bitter, hilft Einlegen in lauwarmes Wasser
- Herbstsorten: abgerüstete Köpfelein halten sich im Kühlschrank 14 Tage

Herkunft: Mittelmeerländer