


Fenchel

1. **Familie** Doldenblütler

2. **Typen**

- Gewürzfenchel (zwei- bis mehrjährig, Blätter und Samen nutzbar)
- Knollenfenchel: Sorten für Ernte im Frühsommer - Herbst / nur im Herbst (alle Angaben auf diesen Seiten nur für Knollenfenchel)



Gemeiner Fenchel.
a Blüte, b Frucht.

3. **Ansprüche**

- an Boden:** - biologisch aktiv für gleichmässiges Wachstum
- an Nährstoffe:** - Mittelzehrer
- Stickstoffmangel führt zu vorzeitigem Aufstängeln
- an Klima:** - Jungpflanzen ertragen im Frühjahr nach einer Anzucht bei mind. 5° C bis zu - 2° C (trocken bis - 4° C)
- ausgebildete Knollen ertragen kaum Frost
- Herbstsorten stängeln auf bei Saat vor Ende Juni

4. **Termine**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Saat f. Setzlinge	---1---		-----2-----				---3---						
Direktsaat				-----2-----				---3---					
Pflanzung			-----										
Ernte					-----								

- Dauer der Anzucht: 5 - 8 Wochen
- Dauer v. Direktsaat bis Erntebeginn: 14 Wochen
- Pflanzung bis Erntebeginn: 8 Wochen
- Dauer der Ernte an 1 Kultur: 3 Wochen
- Anzahl Setzlinge aus 1 g Samen: 90 St.
- Saatmenge/m² bei Direktsaat: 2 g (erdünnern)
- Keimzeit: 14 - 21 Tage
- Samen keimfähig: 2 Jahre

- 1 bis Ende Februar nur für geschützten Anbau (ungeheizter Tunnel o.ä.)
- 2 Sorten für Ernte im Frühsommer - Herbst
- 3 Sorten nur für Herbsterte

5. **Kulturtipps, Pflege**

Abstände (in cm): 30 zw. den Reihen × 15 - 20 in der Reihe

- in nährstoffreichen Böden grosse Abstände einhalten
- im Sommer Direktsaat besser, evtl. gemischt mit Salat oder Rübli in der Reihe
- frühe Kulturen unter Folientunnel etc. möglich; bei Verwendung von Vlies dieses sehr locker auslegen
- Ernte solange die Knollen noch zart sind

6. Gäste

Arten:	Ein seltener Gast: Schwalbenschwanz (farbige Raupen dieses wunderschönen Schmetterlings werden v.a. im Herbst auf Fenchel, Rübli, Dill etc. gefunden. Sie können in einem feinen Maschen- drahtkäfig bis zur Verpuppung gefüttert werden. Überwinterung bei Aussentemperatur, vor Mäusen und Vögeln geschützt. Im Mai die Falter fliegen lassen. Achtung: bereits im Sommer gefundene Raupen schlüpfen ca. 3 Wochen nach der Verpuppung!		
Förderung			

7. Krankheiten

Arten:			
Massnahmen - vorbeugend: - direkt:			

8. Sorten

- Aussaat Mitte Februar bis Mitte Juli: SELMA FINO (ZEFA FINO)
- Aussaat Ende Juni bis Ende Juli: ZEFA TARDO

9. Diverses

- Von frühen Pflanzen können ein paar schlecht ausgebildete Knollen stehen bleiben, sie blühen im Sommer und Herbst und ziehen viele Nützlinge (Schwebfliegen) an. Das Kraut ist ein idealer Dill-Ersatz, die noch grünen, aber gut ausgebildeten Samen können frisch oder getrocknet für Tee verwendet werden.

Herkunft: Asien - östliche Mittelmeerländer