


Pflück-, Schnittsalat

1. **Familie** Körbchenblütler

2. **Typen**

- zum Pflücken oder Schneiden geeignet
- Kopfsalat-Verwandte (am häufigsten)
- Endivien-Verwandte
- Zichorien-Verwandte (bitter)
- grüne / gelbe / rote
- krause / glatte
- Sorten, die einen offenen Kopf bilden (Lollo, Eichblatt)

*Ist der Kopfsalat geschossen,
wird Schnitt- und Pflücksalat genossen.*



3. **Ansprüche**

- an Boden:** - nicht zu schwer, humusreich
(weniger anspruchsvoll als Kopfsalat)
- an Nährstoffe:** - Mittelzehrer
- an Klima:** - je nach Sorte wird Kälte oder Hitze resp. lange Tage gut ertragen

4. **Termine**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Saat f. Setzlinge	-----1-----											
Direktsaat		---2---			-----3-----							
Pflanzung		-----1-----										
Ernte			-----									

- Dauer der Anzucht: 4 - 5 Wochen (Pflücksalat, Lollo)
- Dauer v. Direktsaat bis Erntebeginn: 4 Wochen (Schnittsalat)
- Pflanzung bis Erntebeginn: 2 Wochen (Pflücksalat), 7 - 8 Wochen (Lollo)
- Dauer der Ernte an 1 Kultur: ca. 6 Wochen (Schnitt- und Pflücksalat), 2 Wochen (Lollo)
- Anzahl Setzlinge aus 1 g Samen: 600 St.
- Saatmenge/m² bei Direktsaat: 1g (bei Schnittsalat, nicht erdünnern)
- Keimzeit: 5 - 7 Tage
- Samen keimfähig: 3 Jahre

- 1 für Pflücksalat und Lollo (bis März unter Glas/Plastik)
- 2 unter Glas/Plastik für Schnittsalat
- 3 Freiland für Schnittsalat, evtl. auch für Pflücksalat

5. **Kulturtipps, Pflege**

Abstände (in cm): 25 zw. den Reihen x 15 - 20 in der Reihe (Pflücksalat, Lollo)
(Schnittsalat: 5 - 6 dichte Reihen/Beet)

- Ernte:
 - Pflücksalat: alle 4-6 Tage nur die äussersten Blätter wegbrechen
 - Schnittsalat: mehrmals 1 - 2 cm über dem Boden alles wegschneiden
 - Lollo: ganze Köpfe schneiden
- die schnellste Möglichkeit, um im Frühjahr neuen, grünen Salat zu ernten
- früher Anbau im Frühbeet, in Pikierkisten o.ä., oder im Beet unter Vlies (über Bögen)

6. Schädlinge

Arten:	Blattläuse (v.a. im Frühling unter Glas/Plastik)	Schnecken	
Massnahmen - vorbeugend:	hohe Luftfeuchtigkeit unter Glas/Plastik, am Mittag kalt giessen	nicht neben Wiese o.ä., Schneckenzaun, Schneckenkragen	
- direkt:	spritzen nicht möglich, da die Ernteabstände zu kurz sind	Bretter auslegen, absammeln, Schneckenkörner	

7. Krankheiten

Arten:	div. Fäulniserreger		
Massnahmen - vorbeugend:	nicht zu dicht pflanzen, mit genügend Reihenabstand säen, guter Fruchtwechsel		
- direkt:	fleissig ernten, Faules kompostieren		

8. Sorten

- Pflücksalat: GREEN ICE (Sortenerhaltung am Ebenrain), AUSTRALISCHER GELBER (beide für Frühjahr und Herbst, mittelgrün, kraus, auch als Lollo),
- Schnittsalat: CONFETTI (grün u. rot, eichblättrig), GELBER RUNDER (hellgelb, rundblättrig)
- Lollo, Eichblatt: LOLLO ROSSO (rot/grün, für Sommer und Herbst), LOLLO BIONDA (hellgrün, für Frühling bis Herbst), SMILE (grün, eichblättrig, resistent gegen Blattläuse im Innern des Köpfchens, Samen nicht im Detailhandel), MASERATI (rot, eichblättrig, gesund)

9. Diverses

- Schnittsalat ist eine ideale Zwischenkultur
- Neuheit aus der Familie der Kreuzblütler: ASIA SPICY GREEN MIX (z. Pflücken oder Schneiden, würzig-scharfe Senfverwandte aus Asien)
- Ertrag: 1 - 2 kg/m²

Herkunft: Südeuropa

Pflücksalat



***Pflück mich nur und schneid mich nicht,
dann bin ich voller Zuversicht!***