

Rhabarber

1. **Familie** Knöterichgewächse

2. **Typen**

- Haut und Fleisch grün oder rot

3. **Ansprüche**

- an Boden:**
- mittelschwer bis schwer
 - tiefgründig, feucht, aber durchlässig
- an Nährstoffe:**
- Starkzehrer, Mistgabe nach der letzten Ernte (21. Juni) günstig (gelagerter Pferde- oder frischer strohiger Kuhmist)
 - zu hohe Stickstoff-Düngung fördert die Blütenbildung
- an Klima:**
- eher kühl, nicht zu sonnig, windgeschützt
 - die dicken, fleischigen Wurzeln sind frosthart



4. **Termine**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Saat f. Setzlinge												
Direktsaat												
Pflanzung			--1--							-----1-----		
Ernte				-----								

- Pflanzung bis Erntebeginn: im ersten Jahr nach der Pflanzung nur ganz wenig ernten
- Dauer der Ernte an 1 Kultur: ca. 9 Wochen (bis am 21. Juni)

1 gepflanzt werden zugekaufte Jungpflanzen oder geteilte Wurzelstöcke gesunder alter Pflanzen

5. **Kulturtipps, Pflege**

Abstände (in cm): 120 - 140 zw. den Reihen × 60 - 90 in der Reihe

- tief pflanzen (Knospen mit 5 cm Erde bedeckt)
- unkrautfrei halten, nicht an Stellen mit Problemunkräutern pflanzen (evtl. vorher 1 Jahr mit Bändchengewebe abdecken)
- laufend die grössten "Stangen" (=Blattstiele) *ausbrechen*, nicht abschneiden!
Vorgehen: Daumen an Basis-Innenseite des Stiels legen und nach aussen wegdrücken
- die sehr Oxalsäure reichen Blattspreiten nicht essen
- die ab Mai erscheinenden Blütenstände laufend ausbrechen
- Düngung unmittelbar nach letzter Ernte am längsten Tag
- Lebensdauer bei guter Pflege bis zu 20 Jahren

6. Schädlinge

Arten:	Schnecken	Schwarze Bohnenblattlaus u.a. (selten, eingerollte Blätter)	
Massnahmen - vorbeugend:	rundum von Pflanzen frei halten	Nützlinge fördern	
- direkt:	ablesen	vorübergehend, kein Spritzen nötig	

7. Krankheiten

Arten:	div. Blatt- und Wurzelkrankheiten (sh. z.B. bei http://www.lbbz.tg.ch/documents/Rhabarber_Krankheiten_Schaedlinge.pdf)		
Massnahmen - vorbeugend:	auf Gesundheit kontrollierte Jungpflanzen kaufen		
- direkt:	wiederholen sich Krankheitsbilder während 2 Jahren, entfernen, entsorgen, an anderer Stelle neu pflanzen		

8. Sorten

- SUTTON, FRAMBOZEN ROOD (beide rothätig / grünfleischig, dicke Stiele, hoher Ertrag)
- VALENTIN, ELMSBLITZ (beide rothätig / rotfleischig, feinere Stiele, mittlerer Ertrag)

9. Diverses

- Brühe (starker Tee) aus frischen Rhabarberblättern hilft gegen die Schwarze Bohnenblattlaus auf Bohnen
- Ertrag: 3,5 - 4,5 kg/m²

Herkunft: China