

Rosenkohl

1. **Familie** Kreuzblütler

2. **Typen**

- Herbst- / Wintersorten

3. **Ansprüche**

- an Boden:** - mittlere bis schwere Böden, genügend feucht
- an Nährstoffe:** - Mittel- bis Starkzehrer, recht frischer Kompost günstig
- zu späte Düngung kann Frost-
härte beeinträchtigen
- an Klima:** - Sommer nicht zu heiss und trocken
- Herbstsorten ertragen bis -10°C, Winter-
sorten bis -15°C, nach Abhärtungszeit



4. **Termine**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Saat f. Setzlinge				-----								
Direktsaat												
Pflanzung					--1--	---2---						
Ernte		-----2-----									-----1-----	---2---

- Dauer der Anzucht: 5 - 7 Wochen
- Pflanzung bis Erntebeginn: 18 Wochen (Herbstsorten), 24 Wochen (Wintersorten)
- Dauer der Ernte an 1 Kultur: 8 - 12 Wochen
- Anzahl Setzlinge aus 1 g Samen: 150 St.
- Keimzeit: 6 - 10 Tage
- Samen keimfähig: 4 Jahre

- 1 Herbsterte
- 2 Wintererte

5. **Kulturtipps, Pflege**

Abstände (in cm): 50 - 60 zw. den Reihen x 50 - 60 in der Reihe

- tief pikieren und pflanzen
- evtl. anhäufeln und stützen
- ca. Mitte September evtl. Endknospe entfernen, als Folge bessere Ausbildung der obersten Rosen (bleibt es noch lange warm, gibt's aber übergrosse offene Rosen!)
- Ernte laufend von unten nach oben, oder (nur bei F1-Sorten möglich) ganze Pflanze aufs Mal

6. Schädlinge

Arten:	Weisse Fliege*, Blattläuse (als Folge schwarzer Russtau auf Blättern)	Kohldrehherzgallmücke (Larve zerstört das Herz der Pflanze oder der Röslein)	div. Kohlschädlinge (sh. bei Kopfkohl)
Massnahmen - vorbeugend:	Setzlinge und Jungpflanzen mit Netz schützen, gegen Läuse Nützlinge fördern	Anteil Kohlarten im Garten verringern, Setzlinge und Jungpflanzen mit Netz schützen	
- direkt:	wiederholte Schmierseifen- und/oder Neem-Behandlung	früh befallene Pflanzen entfernen, gut gedeckt kompostieren	

* um ein Überleben von Weissen Fliegen zu verhindern, allen Rosenkohl bis Ende Januar ernten, die Strünke ausgraben, zerkleinern und kompostieren (nur wirksam, wenn gar keine Kohlarten u.a. Kreuzblütler im Garten überwintern)

7. Krankheiten

Arten:	div. Krankheiten (sh. Kopfkohlarten)		
Massnahmen - vorbeugend:			
- direkt:			

8. Sorten

- Sorten für Ernte Oktober - Dezember: AUSLESE (rasche Entwicklung, nicht winterhart)
- Sorten für Ernte November - Januar: HILD'S IDEAL (-SEL. Z), SELMA-ROSKO F1 (beide mit langsamer Entwicklung, recht winterhart)

9. Diverses

- Ertrag: 0.9 - 1.4 kg/m² (ungeputzt)

Herkunft: wahrscheinlich Mitteleuropa